

ما هو ورم الكيس الصفني؟

يعد ورم الكيس الصفني نادر (YST) هو ورم غير حميد (خبيث)، من أورام الخلايا الجرثومية في المبيض وليس الطلائية ، ويتم تشخيص الغالبية العظمى منه في العقدتين الثاني والثالث من العمر عكس سرطان المبيض الحميد. يؤثر سرطان المبيض الخبيث على أكثر على النساء الشابات، ويظهر في مراحل مبكرة، ويكون غالبًا أحادي الجانب (يشمل فقط مبيض واحد) مع نتائج غير خطيرة.

ماهي التوقعات ؟ هل سأكون قادرة على الحمل بعد العلاج؟

ورم الكيس الصفني غالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل مبكرة، حيث تكون التوقعات ممتازة، بمعدل نجاة لمدة 5 سنوات يتجاوز 95%. يتم علاج هذه الأورام وبفعالية بواسطة مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي. اجراء جراحة تحافظ على خصوبة المصابات تعد فعالة بطريقة تشبه فعالية الجراحة الشاملة لأن هذه الأورام غالبًا ما تؤثر في مبيض واحد فقط . تعود الدورة الشهرية الى النساء الشابات بعد بضعة أشهر من انتهاء العلاج الكيميائي كما يوصي أطباء الأورام بالانتظار لمدة سنتين قبل محاولة الحمل.

ما هي الأعراض؟

أكثر الأعراض شيوعًا هي الألم في البطن تليها توسع البطن وتكون مدة الأعراض غالبًا قصيرة بسبب النمو السريع للورم. قد تكون هناك أعراض أخرى مثل الحمى، وتوسع البطن، وسائل داخل البطن (التصبب).

هل يجب إجراء المزيد من الفحوص؟

فحص وجود بروتين ألفا فيتو (AFP) وهو مؤشر حيوي مفيد لتشخيص ورم الكيس الصفني اذ يكون موجودًا في ما يقرب من 100% من الحالات، ويمكن فحصه بسهولة من خلال سحب عينة من الدم الوريدي. قد تحال المريضة إلى خبير في الموجات فوق الصوتية أو لفحص بالرنين المغناطيسي لاكتشاف الورم. كما يُجرى عادة فحص بالتصوير المقطعي للصدر والبطن للبحث عن علامات انتشار المرض قبل الجراحة، لغرض التخطيط للجراحة بطريقة مثلى وإزالة جميع الاثار الناجمة عن الورم  
ما هي الأسئلة الأخرى التي يجب أن أ طرحها؟  
• ما نوع الجراحة التي يجب أن أخضع لها؟

## ورم كيس الصفن (YST) **Yolk Sac Tumors**

- كم يجب أن أنتظر قبل أن أحاول الحمل؟
- هل يجب أن أخضع للعلاج الكيميائي قبل أو بعد الجراحة؟