

หลอดเลือดดำสายสะดือข้างขวาไม่หายไปคืออะไร?

คือภาวะที่เกิดระหว่างการพัฒนาตัวอ่อนทารกในครรภ์ ซึ่งหลอดเลือดดำสายสะดือข้างขวาที่ควรปิดไปตามปกติ กลับยังคงอยู่ เมื่อมีหลอดเลือดดำสายสะดือสองข้าง ทำให้สายสะดือมีหลอดเลือดเกิน (supernumerary vessels)

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มีเพียงทฤษฎีที่อธิบายโดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ภาวะนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่

ชนิดที่ 1 – หลอดเลือดดำสายสะดือข้างขวาไม่หายไปที่มีหลอดเลือดดำดักตัสเวโนซัส (ductus venosus) เชื่อมเข้าหัวใจตามปกติ พบประมาณร้อยละ 95 ของทั้งหมด มีพยากรณ์โรคดี ไม่มีผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดมากนัก

ชนิดที่ 2 – หลอดเลือดดำสายสะดือข้างขวาไม่หายไปที่เชื่อมเข้าหัวใจโดยตรง ทำให้หัวใจรับปริมาณเลือดมากกว่าปกติ มักพบร่วมกับ การไม่มีหลอดเลือดดำดักตัสเวโนซัส พยากรณ์โรคแย่กว่าชนิดที่ 1

เกี่ยวข้องกับโครโมโซมอย่างไร?

เคยมีรายงานพบร่วมกับภาวะโครโมโซมคู่ที่ 18 เกิน (trisomy 18) และกลุ่มอาการนูแนน (Noonan syndrome) นอกจากนี้ อาจพบร่วมกับความผิดปกติของหัวใจทารกในครรภ์ ซึ่งอาจมีหรือไม่มี ความผิดปกติของโครโมโซมร่วมด้วยก็ได้

ควรทำการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่?

ควรตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียด รวมถึงตรวจอัลตราซาวด์หัวใจทารกในครรภ์

ควรเฝ้าระวังอะไรระหว่างการตั้งครรภ์?

ควรตรวจอัลตราซาวด์เป็นระยะ เพื่อติดตามหาภาวะโลหิตจางของทารกในครรภ์ (fetal anemia)

มีผลต่อทารกหลังคลอดอย่างไร?

หากพบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว การพยากรณ์โรคถือว่าดี แต่หากมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่พบร่วมด้วยนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใด ๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2023