

Endometrial Polipler

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Endometrial Polipler Nedir?

Endometrial polipler, rahim iç dokusundan (endometrium) gelişen iyi huylu lezyonlardır. Menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülür (yaklaşık %12). Ancak, menopoz öncesi kadınlarda %6 oranında görülür, bunların %1'i 30 yaş altı kadınlardadır. Polipler, anormal rahim kanamaları, ağrı ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir.

Endometrial Polipler Nasıl Gelişir?

Endometrial poliplerin nasıl oluştuğu tam olarak net değildir. Hormonların ve genetik faktörlerin bu süreçte rol oynadığı düşünülmektedir.

Alınmalı Mı?

Doktorunuz, tıbbi dosyanızı inceleyecek ve tıbbi ve aile geçmişinizi gözden geçirecektir. Bu bilgilerin yanı sıra ultrason muayenesinden elde edilen bilgilerle birlikte, polip için beklemenin mi yoksa polipin alınması için bir işlem yapılmasının mı daha uygun olacağı konusunda sizinle görüşecektir. Bu işlem **histeroskopi** (rahim içinin kamera ile değerlendirilmesi) ile yapılabilir. Polipe elektrikle uyarılmış bir döngü ile yaklaşılr ve sonra bu döngü, vajinal kanaldan rahme yerleştirilen ince bir tüp aracılığıyla geri çekilir. Doktorunuz aynı zamanda, bu el cihazına yerleştirilen kamera ile rahmin iç yüzeyini tamamen inceleyecektir.

Eğer herhangi bir rahatsızlık ya da kanama yaşamıyorsanız ve hamile kalmayı planlamıyorsanız, beklemek bir seçenek olabilir. Eğer menopoz sonrası kanamanız veya anormal kanamanız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, histeroskopi genellikle tercih edilen tedavi seçeneği olacaktır.

Tekrarlar Mı?

Polipler, %13'e kadar tekrar edebilir. Bazı polipler büyüyebilir ve her yıl yaklaşık %1'lik bir artış gösterebilir. Ancak, küçük poliplerin %6'sı da kaybolabilir.

Endometrial Polipler

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Başka Hangi Soruları Sormalıyım?

- Polip alınmalı mı?
- Kansere olabilir mi?
- Polipin alınması ayaktan tedavi ile yapılabilir mi?
- Operasyonun riskleri nelerdir?

Son Güncelleme Aralık 2022