

همانژیوم هیپاتیک چیست؟

همانژیوم کبدی یک تومور خوش خیم (غیرسرطانی) در کبد است که از تجمع رگ های خونی کوچک تشکیل شده است و گاهی می تواند قبل از تولد در سونوگرافی دیده شود. همانژیوم ها در نوزادان نسبتاً شایع هستند، اما معمولاً روی پوست دیده می شوند و بعد از تولد تشخیص داده می شوند.

همانژیوم ها معمولاً ابتدا رشد می کنند و سپس به تدریج خودبه خود کوچک شده و از بین می روند. دو نوع وجود دارد:

- همانژیوم مادرزادی

- همانژیوم کبدی شیرخوارگی

تفاوت آن ها بر اساس این است که آیا توده در زمان تولد به اندازه کامل وجود دارد (مادرزادی) یا بعد از تولد رشد می کند (شیرخوارگی).

این بیماری چگونه ایجاد می شود؟

علت دقیق ایجاد همانژیوم کبدی مشخص نیست. در بیشتر موارد به صورت خودبه خودی و بدون عامل خطر یا علت مشخص ایجاد می شود.

دانشمندان در حال بررسی مکانیسم های مختلفی هستند که باعث رشد غیرطبیعی رگ های خونی می شود.

این بیماری معمولاً ناشی از مشکلات ژنتیکی یا کروموزومی نیست.

اغلب در نیمه دوم بارداری ایجاد می شود، بنابراین ممکن است در سونوگرافی های اولیه دیده نشود.

آیا نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد؟

به دلیل نادر بودن این ضایعه در دوران بارداری، گاهی تشخیص آن دشوار است و ممکن است با تومورهای بدخیم اشتباه شود.

در نتیجه، معمولاً بررسی های تخصصی بیشتری توصیه می شود.

بررسی های ممکن شامل:

- اکوکاردیوگرافی جنین (سونوگرافی تخصصی قلب)

برای بررسی دقیق عملکرد و ساختار قلب جنین

- تصویربرداری با ام آر آی جنین

برای بررسی دقیق تر توده در کبد و ساختارهای اطراف

این روش از میدان مغناطیسی استفاده می کند و اشعه ندارد، بنابراین برای جنین ایمن است

در دوران بارداری باید به چه مواردی توجه شود؟

گاهی جریان خون زیاد در داخل همانژیوم می‌تواند باعث فشار روی قلب جنین یا ایجاد مشکلات قلبی شود.

به همین دلیل معمولاً سونوگرافی‌های مکرر برای موارد زیر انجام می‌شود:

- اندازه توده
- علائم نارسایی قلبی جنین
- اگر علائم نارسایی قلبی یا مشکلات جدی مشاهده شود، ممکن است زایمان زودتر از موعد توصیه شود تا نوزاد سریع‌تر تحت درمان قرار گیرد.

بعد از تولد چه اتفاقی می‌افتد؟

بسیاری از همانژیوم‌های دیده‌شده در دوران بارداری بعد از تولد هیچ علامتی ندارند و مشکلی برای نوزاد ایجاد نمی‌کنند.

پس از تولد:

- سونوگرافی انجام می‌شود
- گاهی سی‌تی‌اسکن یا ام‌آر‌آی و آزمایش خون نیز لازم است
- تشخیص تأیید می‌شود
- سپس نوزاد تحت پیگیری قرار می‌گیرد.
- در بیشتر موارد، همانژیوم به‌تدریج خودبه‌خود کوچک می‌شود.
- در برخی موارد ممکن است بعد از تولد رشد کند و باعث مشکل شود، اما این حالت نادر است.
- در صورت نیاز، درمان‌های دارویی یا مداخله‌ای وجود دارد.

چه سوالاتی باید بپرسم؟

- اندازه همانژیوم کبدی چقدر است؟
- آیا در سونوگرافی علائمی وجود دارد که نشان دهد روی جنین تأثیر گذاشته است؟
- هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی انجام شود؟
- کجا باید زایمان انجام دهم؟
- نوزاد پس از تولد در کجا بهترین مراقبت را دریافت می‌کند؟
- آیا می‌توانم قبل از تولد با تیم پزشکی که از نوزاد مراقبت خواهند کرد ملاقات کنم؟

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم و ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۲