

الفتق الامامى الدماغى Frontal encephalocele

هذا النشرة تساعدك على فهم ما هو الانفتاح الدماغى الأمامى، وماذا يعنى ذلك بالنسبة لطفلى بعد الولادة، وما هى العلاجات المتاحة.

ما هو الانفتاح الدماغى الأمامى؟

الانفتاح الدماغى هو فتح فى جمجمة طفلك يمر من خلالها محتويات الدماغ المغطاة بالجلد (الأغشية الدماغية والدماغ) للخارج. يمكن أن تتطور الانفتاحات الدماغية فى أجزاء مختلفة من رأس طفلك. الانفتاح الدماغى الأمامى هو العيب الذى يتشكل خصيصاً فى جبهة الطفل.

كيف يحدث الانفتاح الدماغى الأمامى؟

هناك نظريات مختلفة تم اقتراحها حول منشأ الانفتاح الدماغى. يعتقد أن الانفتاحات الدماغية تتطور بسبب فشل فى إغلاق هيكل جنينى يُسمى الأنبوب العصبى فى الحياة الجنينية المبكرة. تؤثر هذه التغييرات على التكوين الطبيعى لجمجمة الطفل.

هل يمكن لطفلى أن يكون لديه تشوه آخر مرتبط؟

نعم. يمكن أن يكون لدى حوالي 40% من الأطفال تشوهات مرتبطة فى الرأس والعينين والوجه والصحة، وحتى الأطراف. أكثر التشوهات المرتبطة شيوعاً هي العثور على رأس صغير (الميكروسيفالى) وزيادة السائل داخل الرأس (تضخم البطينات). ومع ذلك، يمكن العثور على الانفتاحات الدماغية أيضاً كعيب معزول.

هل سيكون لدى طفلى القادم انفتاح دماغى أمامى أيضاً؟

إذا كان لطفلك انفتاح دماغى فقط دون عيوب أخرى، فإن احتمالية وجود طفل آخر بهذا المرض منخفضة. ومع ذلك، إذا كان المرض ناتجاً عن عيب وراثى، فقد تزداد هذه المخاطر. هذا هو السبب فى أهمية التقييم المبكر بالموجات فوق الصوتية عند التخطيط للحمل المستقبلى.

ماذا يعنى ذلك بالنسبة لطفلى بعد الولادة؟

يمكن أن تتغير خطة التسليم اعتماداً على حجم العيب. ما لم يُعتبر العيب صغيراً جداً، يُختار غالباً القسم القيصرى لتجنب المزيد من الأذى. بمجرد تشخيص الحمل، يجب متابعة طفلك بواسطة مجموعة من أخصائى (الولادة) أطباء الأطفال، أطباء الأطفال الحداثين، أطباء الأمومة والجنين، جراحى الأعصاب، أطباء الأعصاب وأخصائى الوراثة. (سيقوم هؤلاء المحترفون بإنشاء خطة تسليم واستراتيجية لإجراء الإصلاح الجراحى لمساعدة طفلك على الحصول على أفضل نتيجة ممكنة).

ما هو علاج الانفتاح الدماغى الأمامى؟

يتكون علاج الانفتاح الدماغى الأمامى من استئصال جراحى للنسيج العصبى الغير طبيعى داخل الحقيبة المنتفخة، تليه إصلاح العيب فى الرأس. قد تكون نتائج هؤلاء الأطفال سيئة أحياناً. قد لا يتمكن بعض هؤلاء المرضى من البقاء على قيد الحياة بعد عدة أيام من الولادة، وقد يكون لدى بعض الأطفال الذين ينجون تغييرات كبيرة فى تطورهم العصبى. هذا هو السبب فى أن تقديم خيار إنهاء الحمل قد يُعرض لك بعد تشخيص الحالة (وفقاً لقوانين بلدك)

هل سىحدث مرة أخرى؟

إذا كانت العملية الجراحية ناجحة، فلن يعاود العيب الظهور على وجه طفلك

ما هي الأسئلة الأخرى التي يجب أن أطرحها؟

أين يجب أن ألد؟

ماذا يحدث إذا كان لدى طفلي عيوب أخرى في رأسه؟

كيف يتم إجراء الإجراء لإصلاح العيب الكامل لطفلي؟

أين سيتلقى الطفل الرعاية الأفضل بعد الولادة؟

هل يمكنني مقابلة فريق الأطباء الذين سيساعدون طفلي عندما يولد مسبقاً؟