

اتصال غشایی بند ناف (Velamentous Cord Insertion)

سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.

اتصال غشایی بند ناف چیست؟

اتصال غشایی بند ناف زمانی رخ می‌دهد که بند ناف، که جنین را به جفت متصل می‌کند، به جای اتصال مستقیم به جفت، به پرده‌های جنینی متصل شود. در نتیجه، رگ‌های خونی جنینی که معمولاً در داخل بند ناف و توسط بافت ژلاتینی محافظت می‌شوند، مسیر خود را در داخل پرده‌ها ادامه داده و سپس وارد جفت می‌شوند.

اتصال غشایی بند ناف چگونه ایجاد می‌شود؟

علت دقیق ایجاد اتصال غشایی بند ناف مشخص نیست. این احتمال مطرح شده است که بند ناف در ابتدای بارداری در محل طبیعی خود قرار داشته، اما با تغییر شکل و موقعیت جفت در طول بارداری، محل اتصال بند ناف تغییر کرده و به درستی همراه جفت جابه‌جا نشده است.

آیا نیاز به بررسی‌های بیشتری دارم؟

زمانی که اتصال غشایی بند ناف تشخیص داده می‌شود، پزشکان معمولاً جنین را از نظر وجود ناهنجاری‌های ساختاری بررسی می‌کنند. در بیشتر موارد، ناهنجاری دیگری وجود ندارد.

از آنجا که اتصال غشایی بند ناف گاهی با کوچک بودن جنین همراه است، پزشک معمولاً سونوگرافی‌های سریالی برای ارزیابی رشد جنین درخواست می‌کند. این سونوگرافی‌ها معمولاً هر ۴ تا ۶ هفته یکبار و از حدود هفته ۲۴ بارداری آغاز می‌شوند.

اگر رگ‌های خونی به دهانه رحم نزدیک باشند، ممکن است پزشک سونوگرافی واژینال انجام دهد تا بررسی کند آیا جفت پایین قرار گرفته است یا خیر و آیا رگ‌های بدون محافظ از روی دهانه رحم عبور می‌کنند یا نه. این وضعیت وازا پروپا نام دارد.

تشخیص این وضعیت بسیار مهم است، زیرا رگ‌هایی که روی دهانه رحم قرار دارند ممکن است پیش از زایمان یا هنگام زایمان پاره شوند و خونریزی شدید ایجاد کنند.

در طول بارداری باید به چه نکاتی توجه شود؟

بیشتر بارداری‌ها بدون مشکل ادامه پیدا می‌کنند. با این حال، در صورت خروج مایع از واژن یا شروع انقباضات رحمی، باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید، زیرا این وضعیت‌ها ممکن است باعث فشار روی رگ‌های خونی شوند.

این وضعیت پس از تولد چه تأثیری بر نوزاد دارد؟

اگر اتصال غشایی بند ناف به صورت isolated باشد و با وازا پروپا همراه نباشد، معمولاً پس از تولد مشکلی برای نوزاد ایجاد نمی‌کند.

آیا دوباره تکرار می‌شود؟

اتصال غشایی بند ناف (Velamentous Cord Insertion)

سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.

احتمال تکرار اتصال غشایی بند ناف در بارداری‌های بعدی مشابه جمعیت عادی و حدود ۱٪ است. این خطر در بارداری‌های دوقلویی کمی بیشتر می‌باشد.

چه سوالات دیگری باید پرسیم؟

- سونوگرافی بعدی برای بررسی رشد جنین چه زمانی انجام می‌شود؟
- آیا در سونوگرافی ناهنجاری دیگری دیده شده است؟
- آیا رگ‌های خونی به دهانه رحم نزدیک هستند؟
- زایمان چه زمانی انجام خواهد شد؟
- هر چند وقت یکبار نیاز به سونوگرافی دارم؟
- اگر مایع خارج شود یا انقباضات شروع شوند، با چه کسی باید تماس بگیرم؟

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: آوریل ۲۰۲۳