

Karın İçi Bronkopulmoner Sekestrasyon

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

İntraabdominal Bronkopulmoner Sekestrasyon Nedir?

Bronkopulmoner Sekestrasyon (BPS), normalde hava yoluyla bağlantısı olmayan, işlevsiz akciğer dokusundan oluşan anormal bir kitledir. BPS bebeğin göğsünde ya da karnında bulunabilir. Karnında (bebeğin göbeğinde) bulunduğu buna karın içi BPS denir. Bu kitle normal çalışmaz ve ana kan kaynağını akciğer arterlerinden değil vücudun ana arterinden (aort) alır.

İntraabdominal BPS nasıl tespit edilir?

Karın içi BPS genellikle 18 ila 22. gebelik haftaları arasında yapılan rutin tarama sırasında tespit edilir. Bu taramada bebeğin içerisindeki birçok yapı değerlendirilir. Karın içi BPS, karnında katı beyaz bir kitle olarak görünür. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bu durumun hamileliğin erken dönemlerinde fazladan bir akciğer tomurcuğunun gelişmesi ve beslenme tüpüyle birlikte karın içine göç etmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Karın içi BPS nadirdir ve 10.000 bebekten 1'inde görülür.

Daha fazla tetkik yaptırmalı mıyım?

Karnında kitle olan tüm bebekler, ek yapısal kusurları aramak için ayrıntılı ultrasona tabi tutulmalıdır. Kitleyi ve bebeği izlemek için genellikle art arda ultrasonlar önerilir. Bazen doktorunuz, kitlenin ne olduğu net değilse, kitlenin daha ayrıntılı bir görüntüsünü elde etmek için fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) önerebilir. Doktorunuz, ek bozukluklar mevcut olduğunda bebeğin kromozomlarını değerlendirmek için amniyosentez yapmayı önerebilir. Bir yenidoğan uzmanı ve bir çocuk cerrahı ile görüşmek isteyebilirsiniz. Bebeğin doğumdan sonra nasıl değerlendirileceğini ve takip edileceğini anlamanıza yardımcı olacaklardır.

Hamilelik sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Genellikle kitle 26-28. gebelik haftasına kadar büyür ve daha sonra doğuma kadar aynı boyutta kalır veya küçülür. Nadiren kitlenin boyutu büyür. Çok nadiren, bebeğin cildinde fazla sıvının birikmesi ya da göğüste, karnında veya kalp çevresinde sıvı birikmesi görülebilir. Doktorunuz bebeğin büyüklüğünü kontrol etmek ve bebeğin içinde veya etrafında fazla miktarda sıvı olup olmadığına bakmak için bebeğin yeniden değerlendirilmesini önerecektir.

Doğduktan sonra bebeğimi ne bekliyor?

Doğumdan sonra çoğu bebeğe kitleyi değerlendirmek için ek muayeneler yapılır. Yapılabilecek muayenelerin türü yaşadığınız yere bağlı olabilir. Karın içi BPS tedavisi lezyonun büyüklüğüne

Karın İçi Bronkopulmoner Sekestrasyon

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

göre deęiřir. oęu zaman bebek kitleyi ıkarmak iin ameliyat edilir, ancak bu genellikle acil bir ameliyat olarak yapılmaz. Bazen ok kk kitleler “bekle ve gr” yaklařımıyla takip edilir. İyi haber řu ki, karın ii BPS'li bebeklerin oęunun prognozu iyidir.

Tekrar olur mu?

Karın ii BPS'nin bir sonraki gebelikte tekrar ortaya ıkması ok dřk bir ihtimaldir.

Bařka hangi soruları sormalıyım?

- Ultrasonda bařka anormallikler tespit edildi mi?
- Bunun karın ii bir BPS olduęundan emin miyiz?
- nerdięiniz bařka testler var mı?
- Ne sıklıkla ultrason muayenesi yaptıracaęım?
- Bebeęimin doęumdan sonra ameliyata ihtiyacı olacak mı?
- Nerede doęum yapmalıyım?
- Bebek doęduktan sonra en iyi bakımı nerede alacak?
- Doęumdan nce, bebeęim doęduęunda ona yardımcı olacak doktor ekibiyle tanışabilir miyim?

Yasal Uyarı:

Bu brořrn ierięi sadece genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıřtır. Temel almanız gereken tıbbi tavsiye nitelięinde deęildir. Bu brořrde yer alan ierięe dayanarak herhangi bir eylemde bulunmadan veya herhangi bir eylemden kaınmadan nce bireysel durumunuzla ilgili olarak profesyonel veya uzmanlařmıř bireysel tıbbi tavsiye almalısınız. Brořrlerimizdeki bilgileri gncellemek iin makul abayı gstermemize raęmen, brořrmzdeki ierięin doęru, eksiksiz veya gncel olduęuna dair aık veya dolaylı hibir beyan, garanti veya taahhtte bulunmamaktayız.