

متاستازهای جفتی (Placental Metastases)

سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.

متاستاز جفتی چیست؟

متاستاز اصطلاحی است که زمانی به کار می‌رود که سرطان به اندام دیگری گسترش پیدا کند. هنگامی که سرطان به جفت گسترش یابد، به آن «متاستاز جفتی» گفته می‌شود. اگر بیش از یک ناحیه از جفت درگیر باشد، اصطلاح «متاستازهای جفتی» استفاده می‌شود. در صورت بروز این وضعیت، سرطان معمولاً در مرحله پیشرفته بیماری قرار دارد.

متاستاز جفتی چگونه ایجاد می‌شود؟

بسیاری از سرطان‌ها از طریق جریان خون در بدن گسترش پیدا می‌کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سلول‌های سرطانی از تومور اصلی جدا شده و از طریق خون به اندام دیگری منتقل شوند. ممکن است سرطان از مادر یا از جنین منشأ گرفته و به جفت گسترش یابد.

به‌طور طبیعی، جفت به‌عنوان یک سد محافظ بسیار مؤثر عمل می‌کند و مانع عبور بسیاری از مواد مضر یا خطرناک موجود در خون مادر به جنین می‌شود. بنابراین، اگر مادر مبتلا به سرطان باشد و متاستاز جفتی ایجاد شود، معمولاً این ضایعات در «سمت مادری» جفت قرار دارند و وارد جریان خون جنین نشده‌اند. انتقال سرطان از طریق جفت به اندام‌ها یا خون جنین بسیار نادر است.

برعکس این موضوع نیز صادق است. اگر جنین مبتلا به سرطان باشد و سرطان به جفت گسترش یابد، معمولاً ضایعات در «سمت جنینی» جفت قرار دارند و وارد خون مادر نشده‌اند. انتقال سرطان از جنین به مادر از طریق جفت نیز بسیار نادر است.

چگونه مشخص می‌شود که سرطان به جفت گسترش یافته است؟

در بیشتر سرطان‌های مادر، احتمال گسترش به جفت پایین است. این وضعیت بیشتر در برخی سرطان‌ها مانند سرطان پوست، معده یا ریه گزارش شده است، اما حتی در این موارد نیز نادر محسوب می‌شود.

ممکن است به علت تشخیص سرطان یا درمان‌هایی که دریافت می‌کنید، سونوگرافی‌های بیشتری انجام شود. در این سونوگرافی‌ها جفت نیز بررسی می‌شود و گاهی ممکن است ضایعاتی در جفت مشاهده شوند. با این حال، مشاهده متاستاز جفتی در سونوگرافی غیرمعمول است، زیرا اغلب ضایعات آن‌قدر بزرگ نیستند که دیده شوند.

پس از زایمان، جفت برای بررسی میکروسکوپی ارسال می‌شود تا مشخص شود آیا سرطان به جفت گسترش یافته است یا خیر.

اگر جنین مبتلا به سرطان باشد، ممکن است وجود یک توده در جنین این موضوع را مطرح کند. متاستازهای جفتی ناشی از سرطان جنین معمولاً به شکل توده مشخص در جفت دیده نمی‌شوند و بیشتر باعث می‌شوند جفت ظاهری بزرگ و رنگ‌پریده داشته باشد.

وجود متاستاز جفتی چه تأثیری بر بارداری دارد؟

متاستازهای جفتی (Placental Metastases)

سری اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید.

اگر در سونوگرافی توده‌ای در جفت دیده شود، بررسی دقیق‌تری انجام خواهد شد تا ماهیت آن مشخص شود. در فرد بارداری که سابقه سرطان ندارد، احتمال اینکه این توده متاستاز جفتی باشد بسیار کم است. اما در فردی که مبتلا به سرطان شناخته شده است، این احتمال مطرح می‌شود.

در چنین شرایطی، معمولاً در طول بارداری سونوگرافی‌های بیشتری برای پیگیری وضعیت انجام می‌شود. با این حال، تشخیص قطعی متاستاز جفتی پیش از پایان بارداری امکان‌پذیر نیست و تنها پس از خروج جفت و بررسی میکروسکوپی آن می‌توان تشخیص قطعی داد.

ممکن است متخصص زنان و متخصص سرطان درباره احتمال متاستاز جفتی در صورت مشاهده توده در جفت با شما صحبت کنند. جزئیات بیشتر باید با پزشکان معالج شما مطرح شود.

چه سؤالات دیگری باید از پزشک خود پرسیم؟

- آیا این وضعیت مرحله سرطان من را تغییر می‌دهد؟
- اگر این ضایعه متاستاز جفتی باشد، درمان من (شیمی‌درمانی، رادیوتراپی یا جراحی) چگونه تغییر خواهد کرد؟
- چه زمانی باید زایمان انجام شود؟
- کجا باید زایمان کنم؟

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: سپتامبر ۲۰۲۳