

Over (Yumurtalık) Metastazları

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Overlerde Metastaz Teşhis Edilmesi Nadir Bir Durum Mudur?

Overlerde metastaz teşhis edilmesi nadir değildir: Overdeki kötü huylu tümörlerin %5-20'si, farklı bir bölgeeki tümörün ikincil yerleşimi olarak görülmektedir.

Primer Over Kanseri ile Metastatik Lezyon Ayırımı Yapmak Önemli Midir?

Primer veya metastatik bir over kitlesi arasında ayırım yapmak klinik olarak önemlidir, çünkü yönetimleri farklıdır: Primer over kanseri durumunda cerrahi büyük bir rol oynarken, metastaz durumunda cerrahinin rolü tartışmalıdır ve hasta genellikle asıl tümöre bağlı olarak değişen bir kemoterapi protokolüne alınır.

Hangi Tümörler Overlere Metastaz Yapabilir?

Birçok tümör overlere metastaz yapabilir. En yaygın olanlar şunlardır:

- Meme kanseri
- Mide ve kolorektal kanser
- Safra yolu kanseri (karaciğer, safra kesesi ve safra yolları kanseri)
- Sarkom (vücudun herhangi bir yerinde, içte veya dışta, kas, kemik, tendon, kan damarları ve yağ dokularını etkileyebilen nadir bir kanser türü)
- Lösemi (genellikle kemik iliğinde başlayan bir kanser) ve lenfoma (lenf kanseri)
- Diğer jinekolojik kanserler (rahim ve serviks kanseri)

Hangi Belirtilerim Olabilir?

- Daha önce kanser tanısı konmuş ve takipte olan hastalarda, tamamen asemptomatik (hiçbir belirti göstermeyen) olsa bile, bir over kitlesi rastlantısal olarak teşhis edilebilir.
- Pelvik ağrı veya karın ağrısı, karın şişkinliği, kabızlık veya ishal gibi durumlarda overdeki metastatik kitleler farklı bir tümörün ilk belirtisi olabilir.

Başka Testler Yaptırmam Gerekir Mi?

İlk tetkik genellikle ultrason (transvajinal ve transabdominal) olur. Metastatik over kitleleri genellikle iki taraflıdır ve sonografik görünümleri primer over tümörlerinden farklıdır.

Over (Yumurtalık) Metastazları

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

- Mide kanseri (Krukenberg tümörü), meme kanseri, lösemi ve lenfoma veya rahim kanserinden metastatik lezyonlar genellikle katı görünümündedir.
- Kolorektal (bağırsak) kanser, safra yolu kanseri gibi metastatik lezyonlar ise genellikle heterojendir (gözeli veya gözeli-katı).

Şüphelenilen asıl tümöre bağlı olarak test edilebilecek tümör belirteçleri şunlardır:

- Meme kanseri: CA 15.3
- Kolorektal / safra yolu / pankreas kanseri: CA 19.9
- Mide kanseri: CEA

İkinci düzey bir inceleme genellikle yapılır: bilgisayarlı tomografi (BT) taraması veya pozitron emisyon tomografisi (PET-BT), kanseri evrelemek (asıl tümör bilinmiyorsa) veya takipte olan hastalarda diğer ikincil yerleşimleri belirlemek için kullanılır.

Başka Hangi Soruları Sormalıyım?

1. Bu bir metastatik over kitlesi mi yoksa primer over kitlesi mi?
2. BT taraması yaptırmam gerekiyor mu?

Son Güncelleme Eylül 2019