

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ (Tubal Pregnancy)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่คืออะไร?

เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก (ectopic pregnancy) ชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิไปฝังตัวและเจริญเติบโตนอกโพรงมดลูก ภายในท่อนำไข่ (fallopian tube) ข้างใดข้างหนึ่ง ท่อนำไข่เชื่อมต่อระหว่างรังไข่กับมดลูก แต่ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ ทำให้การตั้งครรภ์ชนิดนี้ไม่สามารถดำเนินต่อ และอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อมารดาได้

อาการที่อาจพบ ได้แก่ ปวดท้องน้อยแบบแปลบ ๆ หรือปวดแบบเสียดแทง มีเลือดออกทางช่องคลอดกระปริบกระปรอย หรือปริมาณมาก รู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หรือความดันโลหิตต่ำ การวินิจฉัยและการรักษาอย่างรวดเร็วมีความสำคัญมากเพื่อป้องกันภาวะท่อนำไข่แตก ซึ่งอาจทำให้เลือดออกภายในอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต

วิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและความรุนแรงของแต่ละราย เช่น การรักษาด้วยยาเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การผ่าตัดเพื่อนำเนื้อเยื่อการตั้งครรภ์ออก (โดยพยายามเก็บรักษาท่อนำไข่ไว้หากทำได้) หรือในกรณีรุนแรงอาจต้องผ่าตัดเอาท่อนำไข่ข้างที่ผิดปกติออกทั้งข้าง

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

บางรายอาจไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่มักสัมพันธ์กับภาวะที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนจากท่อนำไข่เข้าสู่มดลูก โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ อายุมารดา ความผิดปกติแต่กำเนิดของท่อนำไข่ พังผืดหรือแผลเป็นในท่อนำไข่จากการติดเชื้อหรือการผ่าตัด โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) การตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือการทำให้เด็กหลอดแก้ว (in vitro fertilization หรือ IVF) การตั้งครรภ์ขณะใช้ห่วงคุมกำเนิด (intrauterine device หรือ IUD) การตั้งครรภ์หลังทำหมัน (tubal ligation) เคยมีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อน รวมถึงการสูบบุหรี่ในช่วงตั้งครรภ์

ควรตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การตรวจวินิจฉัยหลักคือ การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (transvaginal ultrasound) เพื่อดูตำแหน่งของการตั้งครรภ์ และประเมินอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ได้แก่ มดลูก รังไข่ และท่อนำไข่ การตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การตรวจเลือดเพื่อติดตามระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (beta-hCG) เป็นระยะ การตรวจเลือดหาภาวะซีดหรือการสูญเสียเลือด การตรวจภายใน (pelvic exam) เพื่อประเมินอาการปวด กดเจ็บ หรือก้อนผิดปกติในอุ้งเชิงกราน และอาจจำเป็นต้องตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดซ้ำเพื่อติดตามเป็นระยะหลังการรักษา

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?

ความเสี่ยงของการเกิดซ้ำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงประวัติเคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อน ควรแจ้งประวัติทั้งหมดให้แพทย์ทราบในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ (Tubal Pregnancy)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2024