

قفسه سينه (Thorax)

مجموعه اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

بهترین زمان برای بررسی قفسه سينه جنين چه زمانی است؟

معمولاً یک سونوگرافی روتین در سه ماهه دوم بارداری بين هفته های ۱۸ تا ۲۲ بارداری انجام می شود.

هدف اصلی این بررسی:

- اندازه گیری های جنين برای تشخيص اختلالات رشد
- شناسایی ناهنجاری های ساختاری (مالفورماسيون ها)

در بررسی قفسه سينه جنين چه چیزهایی باید ارزیابی شود؟

در سونوگرافی روتین سه ماهه دوم، موارد زیر بررسی می شوند:

- ریه ها
- قلب
- عضله ديافراگم
- شکل قفسه سينه
- دنده ها

ارزیابی قفسه سينه چگونه انجام می شود؟

در سونوگرافی سه ماهه دوم یا سوم، پزشک موارد زیر را بررسی می کند:

- شکل کلی قفسه سينه
- انحناي دنده ها
- تقارن هر دو ریه
- وجود یا عدم وجود توده ها
- سلامت ديافراگم (عضله جداکننده قفسه سينه از شکم)
- موقعیت طبیعی معده و کبد

همچنین قلب نیز به طور کامل بررسی می شود.

اگر در قفسه سينه جنين یافته غيرطبیعی دیده شود چه می شود؟

اگر در سونوگرافی روتین، تغییرات غيرطبیعی در ساختار قفسه سينه مشاهده شود:

- بررسی دقیق تر و تخصصی تر جنين انجام می شود
- احتمال وجود ناهنجاری در سایر اندام ها بررسی می گردد
- ممکن است پیگیری های سریالی در بارداری لازم شود

پیگیری در ادامه بارداری

مجموعه اطلاعات برای بیمار – آنچه باید بدانید، آنچه باید پرسید

در بسیاری از موارد، پزشک ممکن است توصیه کند:

- سونوگرافی های سریالی در سه ماهه سوم
- بررسی رشد قفسه سینه
- بررسی تکامل ریه ها، قلب و سایر ساختارهای داخلی
- ارزیابی روند تغییرات یافته های اولیه

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/ وبسایت صرفاً برای اطلاع رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به روز باشد، هیچگونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به روز بودن محتوا ارائه نمی شود.

مترجم:

دکتر آناهیتا دادعلی، پزشک، لینکلن شایر، انگلستان

ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به روزرسانی: آوریل ۲۰۲۴