

این وضعیت چیست؟

سندرم نقص دیواره بدن و اندام‌ها یک ناهنجاری شدید است که در آن اندام‌ها و ارگان‌های داخلی جنین خارج از بدن قرار دارند و به جفت متصل می‌شوند. در این حالت، جنین نمی‌تواند به طور طبیعی حرکت کند یا رشد نماید و ارگان‌ها آسیب می‌بینند. این وضعیت نادر است و حدود یک مورد در هر پانزده هزار بارداری دیده می‌شود.



Normal



LBWC

© پاناییتسکو آ. ام، اوشاکوف ف، کالاسکار آ، پاندیا پ. پ. ویژگی‌های سونوگرافی و مدیریت ناهنجاری بند بدنی. مجله تشخیص و درمان جنین. ۲۰۱۶؛ جلد ۴۰، شماره ۴: ۲۸۵ تا ۲۹۰. شناسه دیجیتال: ۱۱۵۹/۱۰.۰۴۴۴۲۹۹/۱۰۰. انتشار آنلاین: ۱ مارس ۲۰۱۶. شناسه پاب‌مد: ۲۶۹۲۸۹۲۶

در تصویر سمت چپ، جنین طبیعی دیده می‌شود که بند ناف و اندام‌ها آزادانه در مایع اطراف جنین شناور هستند و تمام ارگان‌های داخلی در داخل بدن قرار دارند. در تصویر سمت راست، جنین مبتلا به این سندرم دیده می‌شود. ارگان‌های داخلی از طریق یک نقص در دیواره شکم خارج شده و به جفت چسبیده‌اند و بند ناف بسیار کوتاه است. به دلیل ثابت بودن وضعیت، با رشد جنین، وضعیت غیرطبیعی ستون فقرات و اندام‌ها ایجاد می‌شود.

این وضعیت چگونه تشخیص داده می‌شود؟

در صورت مشاهده موارد زیر در سونوگرافی، به این تشخیص شک می‌شود:

- کوتاه بودن یا نبود بند ناف
- ثابت بودن و وضعیت غیرطبیعی جنین در طول بررسی
- وجود ناهنجاری در صورت یا شکم

علت این وضعیت چیست؟

علت دقیق ناشناخته است، اما تصور می‌شود به اختلال در روند تکامل اولیه بارداری مربوط باشد. اگر جنین به درستی شکل نگیرد یا چرخش و تاوردگی طبیعی رخ ندهد، یا خون‌رسانی به ارگان‌های حیاتی مختل شود، این موضوع می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های شدید شود. در بیشتر موارد، ارگان‌هایی که باید در داخل شکم باشند به جفت متصل می‌شوند.

آیا نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد؟

تشخیص این وضعیت معمولاً از هفته یازده تا سیزده بارداری با سونوگرافی قابل انجام است. در برخی موارد ممکن است سونوگرافی و اژینال برای بررسی دقیق‌تر پیشنهاد شود.

معمولاً آزمایش‌های اضافی لازم نیست.

در دوران بارداری چه مواردی باید بررسی شود؟

متأسفانه بسیاری از جنین‌های مبتلا قبل از تولد از بین می‌روند. به دلیل شدت این ناهنجاری، والدین ممکن است در صورت قانونی بودن، امکان پایان دادن به بارداری را داشته باشند.

اگر بارداری ادامه یابد:

- بررسی‌های منظم برای رشد جنین و وضعیت جفت انجام می‌شود
- جفت ممکن است غیرطبیعی باشد و به دیواره رحم چسبیده یا نزدیک دهانه رحم قرار گیرد
- این وضعیت خطر خونریزی در بارداری یا هنگام زایمان را افزایش می‌دهد

بعد از تولد چه اتفاقی برای نوزاد می‌افتد؟

نوزاد ممکن است زنده متولد شود یا هنگام زایمان از بین برود. اغلب نوزاد همراه با جفت متولد می‌شود و ظاهر بسیار غیرطبیعی دارد. اگر نوزاد زنده متولد شود، معمولاً مدت کوتاهی زنده می‌ماند. تیم پزشکی ممکن است اقداماتی برای کاهش درد و افزایش راحتی نوزاد انجام دهد، که بهتر است پیش از زایمان درباره آن صحبت شود. با این حال، بیشتر نوزادان در مدت کوتاهی پس از تولد فوت می‌کنند.

آیا این مشکل دوباره تکرار می‌شود؟

احتمال تکرار این وضعیت در بارداری‌های بعدی بسیار کم است.

چه سوالاتی باید بپرسم؟

- آیا نیاز به سونوگرافی‌های بیشتر دارم؟
- کجا باید زایمان انجام شود؟
- نوزاد هنگام تولد چه ظاهری خواهد داشت؟
- آیا می‌توانم قبل از زایمان با تیم پزشکی نوزاد ملاقات کنم؟

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم و ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: سپتامبر ۲۰۲۲