

หลอดเลือดดำสายสะดือโป่งพอง (Umbilical Vein Varix หรือ UVV)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

หลอดเลือดดำสายสะดือโป่งพองคืออะไร?

เป็นการโป่งพองของหลอดเลือดดำสายสะดือ (umbilical vein) ส่วนที่อยู่ในช่องท้องของทารกในครรภ์ก่อนเข้าสู่ตับ

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

หลอดเลือดดำสายสะดือตำแหน่งนี้เป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดเพราะไม่มีสายสะดือ (umbilical cord) ห่อหุ้ม หากความดันภายในหลอดเลือดดำเพิ่มขึ้น จะเกิดการโป่งพอง

เกี่ยวข้องกับโครโมโซมอย่างไร?

ประมาณร้อยละ 5–10 ของหลอดเลือดดำสายสะดือโป่งพองสัมพันธ์กับความผิดปกติของโครโมโซม และอีกร้อยละ 5–10 พบความผิดปกติของทารกในครรภ์ร่วมด้วย อย่างไรก็ตามร้อยละ 70–80 พบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว

ควรทำการตรวจเพิ่มเติมหรือไม่?

ควรตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียด และทำการตรวจทางพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม

ควรเฝ้าระวังอะไรระหว่างการตั้งครรภ์?

ควรติดตามในศูนย์ที่ดูแลการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง และตรวจอัลตราซาวด์เป็นระยะเพื่อประเมินสุขภาพหรือตรวจหาภาวะแทรกซ้อนของทารกในครรภ์

มีผลต่อทารกหลังคลอดอย่างไร?

หากพบภาวะนี้เพียงอย่างเดียว การพยากรณ์โรคถือว่าดี แต่หากมีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับสาเหตุและชนิดของความผิดปกติที่พบ

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2023