

Ürinom nedir ve nasıl oluşur?

Fetal böbrekler idrar üretir ve bu idrar üreterler yoluyla mesaneye akar. Bazen, idrarın böbrekten dışarı akışında bir tıkanıklık olur ve bu da fetal böbreğin yırtılmasına ve idrarın mesaneye akmak yerine böbreğin etrafında toplanmasına neden olabilir. Bu sıvı toplanmasına ürinom adı verilir. Fetal ürinomun neden olduğu her zaman açık değildir. Ürinomun en yaygın nedenleri, posterior üretral valflerden (üretrada tıkaçıcı bir zar) veya üreteropelvik bileşke tıkanıklığından (üreterin ilk kısmının tıkanması) kaynaklanan idrar akışındaki tıkanıklıklardır.

Ürinom ne kadar yaygındır?

Ürinom, doğum öncesi dönemde nadir görülen bir bulgudur. Ürinom önlenemez.

Nasıl tespit edilir?

Fetal ürinom gebelik sırasında ultrason kullanılarak teşhis edilebilir. Bunlar tipik olarak gebeliğin 3. üç aylık döneminde rutin muayene sırasında teşhis edilir. Genellikle sadece bir böbrek etkilenir, ancak bazen her iki böbrekte de ürinom olabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Bir ürinomdan şüphelenildiğinde, ürinomun boyutunu değerlendirmek, diğer böbreği, bebeğin büyümesini ve amniyotik sıvı hacmini kontrol etmek için düzenli olarak ek ultrason muayeneleri planlanmalıdır. Ürinomların boyutu artabilir veya azalabilir ve bazen hamilelik sırasında kaybolabilir. Şu anda normal böbrek çalışmasını önceden tahmin edebilecek bir ultrason bulgusu yoktur.

Fetal yaşam sırasında ürinomlar genellikle herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç duymaz, ancak çok büyürlerse boşaltılmaları gerekebilir. Bazen fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) önerilebilir.

Doğduktan sonra bebeğimi ne bekliyor?

Ürinomlu bebeklerin çoğu vajinal yolla doğurtulabilir ve sonuçları iyidir. Etkilenen böbreğin işlevinin sınırlı olması muhtemel olsa da, bebeğin iki böbreği olduğu ve diğeri iyi çalıştığı sürece, normal böbrek etkilenen böbreğin işlevini üstleneceğinden normal böbrek işlevi beklenir.

Doğumdan sonra, ürinoma neyin neden olduğunu anlamak ve etkilenen böbreğin işlevini değerlendirmek için ek tetkikler yapılacaktır. Bu ek testler arasında manyetik rezonans

Fetal Ürinom

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, böbreklerin ultrasonla işlevsel olarak test edilmesi ve kan testleri yer alabilir.

İdrar akışındaki tıkanıklık devam ediyorsa ve böbrek fonksiyonu iyiye, ameliyat gerekebilir. Klasik ameliyata piyeloplasti denir. Bu ameliyatta tıkanıklık giderilir ve üreter böbreğe yeniden bağlanır.

Posterior üretral kapaklar tespit edilirse, bunların cerrahi olarak kesilmesi gerekir. Ameliyattan sonra bebeğin böbrek fonksiyonu çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca izlenecektir.

Başka hangi soruları sormalıyım?

- Sadece bir böbrek mi etkilenmiş? Diğer böbrek normal mi?
- Başka herhangi bir anormallik görülüyor mu?
- Ne sıklıkla ultrason muayenesi yaptırmalıyım?
- Hamileliğim nerede takip edilmeli?
- Nerede doğum yapmalıyım?
- Bebek doğduktan sonra en iyi bakımı nerede alacak?
- Bebeğim doğduğunda ona yardımcı olacak doktor ekibiyle doğumdan önce tanışabilir miyim?

Güncelleme Haziran 2023