

Bikorporal Uterus (Çift Rahim)

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Çift Rahim Nedir?

Çift rahim, rahmin üst kısmında (fundus) orta hatta, rahim duvarının kalınlığının %50'sinden daha fazla olan bir dış çentik ile karakterizedir. Bu çentik, rahim gövdesini (corpus) ve bazen serviks (rahim ağzı) ve/veya vajinayı tamamen veya kısmen bölebilir. Septat uterus (rahimde perde) olduğu gibi, Çift rahim de iç boşluğu ikiye bölen bir iç çentik ile birlikte görülür.

Çift Rahim Nasıl Oluşur?

Çift rahim nadir bir durumdur. Embriyonun gelişimi sırasında Müllerian kanal yapılarının birleşmesinin başarısız olması durumunda ortaya çıkar.

Çift Rahim Nasıl Teşhis Edilir?

Rahmin şekli ve konturundaki yapısal farklılıkların önemli bir kısmı, genellikle doğurganlık araştırmaları sırasında teşhis edilir. Doğru teşhis ve doğru sınıflandırma, uygun danışmanlık yapılmasına yardımcı olur. Ultrasonografi, histerosalpingografi (HSG – ilaçlı rahim filmi) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleri, rahimdeki yapısal farklılıkları girişimsel olmayan bir şekilde taramak ve sınıflandırmak için kullanılabilir. Geleneksel 2 boyutlu transvajinal ultrason (TVUS) ve HSG iyi bir tarama yöntemi olarak kabul edilirken, 3 boyutlu TVUS ve MRI doğuştan gelen anomalileri doğru şekilde teşhis edebilir.

Çift Rahim Gebeliği Nasıl Zorlaştırabilir?

Çift rahim ile ilişkili en yaygın komplikasyon, erken doğumdur. Ayrıca, çift rahimdeki bir gebelik, doğum sonrası kanama ile sonuçlanabilir. Bu anomali, ilk gebelikte bile rahim yırtılması için bir risk faktörüdür.

Rahim anomalilerinin böbrek anomalileriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle, kadın gebelik dönemi boyunca gebelik kaynaklı hipertansiyon açısından da yüksek risk altındadır.

Çift Rahmin Diğer Komplikasyonları Nelerdir?

Çift rahim, endometriyal kanser için bağımsız bir risk faktörü olmamasına rağmen, olağandışı rahim yapısıyla bu popülasyonda endometriyal kanser (rahim içi kanseri) fark edilmeyebilir.

Bikorporal Uterus (Çift Rahim)

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Sağlıklı rahim boşluğundan alınan bir biyopsi, yanlış negatif sonuçlara yol açarak teşhisin gecikmesine ve hastanın seyrinin kötüleşmesine neden olabilir.

Vakaların %25'inde, obstrüktif adet akışı semptomlarına veya ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilecek uzunlamasına bir vajinal septum (perde) bulunur. En yaygın defektlerden biri, böbreklerden birinin eksik olmasıdır; bu duruma “renal agenezi” denir.

Çift Rahim Nasıl Yönetilir?

Çift rahmi olan bir hastanın yönetimi, hastanın başvuru şekline bağlıdır. Hamilelik sırasında rutin bir değerlendirme için gelen ve çift rahim teşhisi konulan bir kadın için doğum öncesi komplikasyonları (örneğin erken doğum) önlemek amacıyla yakın doğum öncesi izlem önerilir.

Bir hasta ayrıca, önceki gebeliklerde tekrarlayan düşükler veya erken doğum öyküsü ile başvurabilir. Yukarıda belirtilen durum, rahmin cerrahi olarak birleştirilmesi için Strassman metroplasti ameliyatının yapılmasını gerektirir.

Son Güncelleme Ağustos 2023