

Fetus-In-Fetu (Fetüs İinde Fetüs)

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Fetüs-in-fetu (FIF) Nedir?

Fetüs-in-fetu (FIF), tek yumurta ikizlerinde, gelişim sırasında normal olan kardeşinin vücudunda şekil bozukluğu olan bir fetüsün bulunması durumudur. Bu durum, yaklaşık olarak 500.000 canlı doğumda bir görülür.

Fetüs-in-fetu Nasıl Tespit Edilir?

Fetüs-in-fetu, doğum öncesi ultrason ile tespit edilebilir. Genellikle bebeğin karın içinde kenarları net bir şekilde görünen karmaşık bir kitle olarak görünür. Bu kitlenin içinde sıvı dolu bir kese ve içinde katı elemanlar veya kemik yapıları bulunabilir. Ayrıca kitlenin içinde kalsifikasyonlar (kalsiyum birikimine bağlı taşlaşma) da olabilir.

Fetüs-in-fetuye Ne Sebep Olur?

FIF'in gelişimi için iki ana teori öne sürülmüştür. Birinci teori, FIF'in, teratom (anormal hücre topluluğu) olarak adlandırılan bir yapının çok farklılaşmış bir formu olduğudur. Diğer teori ise "parazitik ikiz" teorisidir. Bu teori, şekil bozukluğu olan bir fetüsün, diğer normal ikizinin vücudunda oluştuğunu ve ortak bir kan dolaşımını paylaştığını öne sürer. Çoğu insan, "parazitik ikiz" teorisinin açıklama olduğunu düşünmektedir.

Daha Fazla Test Yaptırmalı Mıyım?

Kitleyi ve ilişkili anomalileri değerlendirmek için ek testler önerilecektir.

Önerilebilecek testler şunları içerebilir:

- **Detaylı ultrason incelemesi:** Bu, bebeğinizde başka anormallikler olup olmadığını dikkatlice incelemeyi amaçlar.
- Bazen, fetüsün manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapılabilir; bu, teşhisi doğrulamaya ve çocuk cerrahlarının cerrahi planlama yapmasına yardımcı olabilir. Bu test, mevcutsa ve gebeliğin yönetimini değiştirecekse yapılabilir.

Gebelik Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fetus-In-Fetu (Fetüs İinde Fetüs)

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

FIF olan bebekler, gebelik sırasında bazı problemler geliştirme riski taşır. Bu yüzden ou uzman, düzenli ultrason incelemeleri yapılmasını önerir. Doktorunuz, bu testlerin ne sıklıkla yapılacağına karar verecektir. Ultrason, bebeğinizin böbreklerinde veya karın bölgesinde fazla sıvı birikmesi olup olmadığını ya da karındaki artan baskı nedeniyle büyük bir karın çevresi olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Zaman zaman kese içeriğı sızıntısı veya amniyon sıvısının fazla birikmesi (polihidramniyos) gibi komplikasyonlar olabilir. Bebeğın karın bölgesi doğum kanalından geçemeyecek kadar büyük olursa, sezaryen doğum gerekebilir.

Bebeğime Doğumdan Sonra Ne Olur?

Bebek doğduktan sonra, ocuk doktorları, bebeğı beslemeden önce teşhisi doğrulamak için ek testler yapacaktır. Bu testler arasında karın ultrasonu, röntgen, tomografi (BT), MRG veya ocuk doktorlarının önerilerine göre diğerk testler yer alabilir. Bebeğın sağık durumu kontrol altına alındığında, kitle cerrahi ile ıkarılacak ve patoloji bölümüne gönderilecektir.

Fetüs-in-fetu genellikle uzun vadeli herhangi bir probleme yol açmaz, ancak bebeğiniz ultrason, MRG veya tomografi ile izlenebilir. Alfa-fetoprotein (AFP) ve human koryonik gonadotropin (hCG) gibi kan testleri, kötü huylu tümör gelişimini tespit etmek için doğumdan sonra 2 yıl süreyle gerekli olabilir. Önceki araştırmaların ou, parazitik ikizin ıkarılmasının ardından normal sonuçlar gösterdiğini bildirmiştir.

Bu Durum Tekrar Eder Mi?

İkinci bir bebeğın FIF ile doğma riski son derece düşüktür.

Fetus-In-Fetu (Fetüs İinde Fetüs)

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Başka Hangi Soruları Sormalıyım?

- Bebeğimde başka anormallikler görüyor musunuz?
- Böbrek tıkanıklığı veya karın şişliğı bulguları var mı?
- Bebeğimin etrafındaki amniyon sıvısı normal mi?
- Ne sıklıkla ultrason incelemeleri yapılacak?
- Bu incelemeler sırasında neye bakılacak?
- Nerede doğum yapmalıyım?
- Bebeğimin doğum sonrası en iyi bakımı alacağı yer neresi olacak?
- Bebeğimi izleyecek doktor ekibiyle önceden tanışabilir miyim?

Son Güncelleme Temmuz 2022