

## ما هو السل في عنق الرحم؟ Tuberculosis of the Cervix

السل أو السل الرئوي هو بكتيريا يمكن أن تؤثر على أي جزء من جسمك، ولكن غالباً ما تؤثر على الرئتين. العدوى الأولية في الرئتين تعرف باسم السل الرئوي. في بعض الحالات، تنتقل العدوى بالسل عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم. عندما تصل البكتيريا إلى المجرى التناسلي، تسبب السل التناسلي أو السل الحوضي.

### كيف يحدث السل في عنق الرحم؟

النساء اللاتي يعانين من السل الرئوي (الرئتين) سيطورن في نهاية المطاف السل التناسلي والحوضي إذا ترك دون علاج. يمكن أيضاً أن ينتشر السل التناسلي لعنق الرحم نتيجة للاتصال الجنسي مع شخص مصاب.

### ما هي أعراض السل في عنق الرحم والسل التناسلي بشكل عام؟

يكون السل التناسلي عادةً عدوى صامتة بدون أعراض واضحة حيث قد تظل البكتيريا في جسمك كما هو الحال لمدة تصل إلى 10 إلى 20 عامًا. ومع ذلك، يمكن أن تشمل بعض الأعراض التي يجب مراقبتها:

- دورة شهرية غير منتظمة
- ألم في منطقة الحوض
- إفرازات مهبلية ملونة بالدم أو مستمرة أو ثقيلة أو ملونة
- نزيف بعد الجماع
- العقم

عدم وجود أعراض قد يجعل من الصعب تشخيص السل التناسلي. اعتماداً على أعراضك، قد ينصحك الطبيب بإجراء اختبارات لتأكيد التشخيص.

### كيف يمكن أن يؤثر السل التناسلي على إمكانية الحمل؟

في النساء، يؤثر السل التناسلي أو السل الحوضي عادةً على الأنابيب الرحمية مسبباً انسداداً للأنابيب، والذي لا يمكن علاجه. إذا تم تشخيص السل في مرحلة مبكرة وتم علاج العدوى، قد يشفى الضرر في الرحم أو الأنابيب. إذا تم تركها بدون علاج لفترة طويلة، قد لا يشفى السل في الأنابيب الرحمية والمبيضين والرحم، مما قد يؤدي إلى تكوين ندبات في الرحم يؤدي عادةً إلى فقدان الحيض أو قلة الدورة الشهرية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن النساء من الحمل.

### كيف يتم علاج السل في عنق الرحم و/أو السل التناسلي؟

العلاج للسل التناسلي هو نفسه كمعالجة السل في الرئتين أو أي شكل آخر من أشكال السل من خلال دورة من المضادات الحيوية تستمر حوالي ستة إلى ثمانية أشهر. من المهم إكمال العلاج بأكمله.

