

Üç Kulakçıklı Kalp (Kor Triatriatum Dekster)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Bu broşür, Kor Triatriatum Dekster'in (Üç Kulakçıklı Kalp) ne olduğunu, nedenlerini ve teşhis edilmesinin siz, bebeğiniz ve aileniz üzerindeki etkilerini anlamana yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Üç kulakçıklı kalp nedir?

Normal kalp dört odacıktan oluşur: iki atriyum (sağ ve sol kulakçık) ve iki ventrikül (sağ ve sol karıncık). Kan normalde atriyumlardan ventriküllere, oradan da akciğerlere ve vücudun geri kalanına geçer. KTD (kor triatriatum dekster), sağ atriyumun bir zar tarafından iki bölmeye ayrılması durumudur. Bu zar, sağ atriyumdan sağ ventriküle kan geçişini zorlaştırabilir.

Üç kulakçıklı kalp nasıl meydana gelir?

Sağ atriyumun normal gelişiminde bir değişiklik meydana gelir; bu değişikliğin nedeni bilinmemektedir. KTD, intrauterin yaşam sırasında (doğumsal kalp anomalilerinin %0.1-0.4'ünden azını temsil eden) nadir bir kalp anomalisi olarak gelişir.

Bu anomali neden önemlidir?

KTD, küçük bir sağ ventrikül gibi doğumda bebeğin ciddi semptomlar göstermesine neden olabilecek önemli kalp anomalileri ile ilişkili olabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir. KTD'ye eşlik eden başka kalp kusurları yoksa, bu durum gebelik veya bebek için ciddi bir risk teşkil etmez.

Daha fazla test yaptırmalı mıyım?

Gebelik sırasında bebeğin kalbini değerlendiren özel bir ultrason olan fetal ekokardiyografi yapılması önemlidir. Bu test, herhangi bir ilişkili kalp anomalisinin var olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlar. Gebelik süresince patolojinin seyrini takip etmek için periyodik ultrasonlar yapılacaktır. KTD'nin kalp dışı anomaliler, genetik sendromlar veya kromozomal

Üç Kulakçıklı Kalp (Kor Triatriatum Dekster)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

anormalliklerle bilinen bir ilişkisi yoktur. Doktorunuz, daha ileri genetik incelemeleri görüşmek üzere sizi genetik danışmanlığa yönlendirebilir.

Gebelik sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

KTD'ye sahip fetüslerde diğer kalp kusurları gelişim sürecinde ortaya çıkabileceğinden, gebelik boyunca ultrason takibi önerilir. Bu patolojinin varlığı, gebeliğin obstetrik yönetimini değiştirmez.

Doğumu nerede yapmalıyım? Bebek doğduktan sonra en iyi bakımı nerede alabilir?

Bu, KTD'ye eşlik eden bir kalp kusurunun olup olmamasına bağlıdır:

- Eğer büyük bir kalp anomalisi yoksa, üçüncü basamak bir hastanede doğum yapmanız gerekli olmayabilir.
- Ancak, hipoplastik sağ ventrikül veya pulmoner hipoplazi gibi kalp anomalilerinin varlığında, yenidoğanın uygun şekilde yönetilebilmesi için doğumun üçüncü basamak bir hastanede yapılması önerilir.

Üç kulakçıklı kalp, doğduktan sonra bebeğim için ne anlama gelir?

Eğer sağ atriyumdaki engel hafifse, çoğu durumda çocuklar asemptomatik olur ve yalnızca pediatrik kardiyolog tarafından düzenli olarak takip edilmeleri yeterlidir.

KTD, hipoplastik sağ ventrikül gibi belirgin kalp anomalileriyle ilişkiliyse, bebek doğumdan itibaren nefes darlığı veya hızlı soluk alıp verme, cilt, dudak veya tırnaklarda morarma (siyanoz), beslenme güçlüğü, düşük kilo alımı ve yorgunluk gibi belirtiler gösterebilir. Bu çocuklarda kalp ameliyatı gerekebilir. Pediatrik kardiyolog veya cerrah, çocuğunuz için en uygun tedavi seçeneğini size açıklayacaktır.

Ameliyat sonrasında çocuğunuz hayatı boyunca kardiyolog tarafından düzenli takip gerektirecektir. Cerrahi müdahaleye rağmen, çocuklarda kalp sorunları devam edebilir ve tedavi gerekebilir. Çoğu durumda çocuklar aktif olabilir, ancak fiziksel aktivite seviyesi bireysel olarak değişecektir.

Üç Kulakçıklı Kalp (Kor Triatriatum Dekster)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Tekrarlar mı?

Üç kulakçıklı kalbin nedeni bilinmediğinden, tekrarlama riski de şu an için bilinmemektedir.

Son Güncelleme Haziran 2022