

Ekstremit Vücut Duvar Kompleksi (LBWC)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Ekstremit Vücut Duvarı Kompleksi Nedir?

Ekstremit Vücut Duvarı Kompleksi (LBWC), bebeğin organlarının bebeğin vücudunun dışında olduğu ve plasentaya bağlı olduğu ciddi bir anormalliktir. Bebek düzgün hareket edemez veya büyüyemez ve organlar hasar görür. LBWC nadir görülür ve yaklaşık 1:15.000 gebeliği etkiler.



Normal



LBWC

© Panaitescu AM, Ushakov F, Kalaskar A, Pandya PP. Ultrasound Features and Management of Body Stalk Anomaly. Fetal Diagn Ther. 2016;40(4):285-290. doi: 10.1159/000444299. Epub 2016 Mar 1. PMID: 26928926

Soldaki resimde amniyotik sıvı içinde serbestçe yüzen normal bir bebek ve göbek kordonu görülmektedir. Bebeğin kolları ve bacakları hareket etmekte serbesttir ve iç organlar vücudun içinde yer almaktadır. Sağdaki resimde bebek LBWC'ye sahiptir. Bebeğin iç organları karnındaki bir delikten dışarı çıkmıştır ve organlar plasentaya yapışmıştır ve göbek kordonu çok kısadır. Sabit pozisyon nedeniyle, bebek büyümeye devam ettikçe omurgasında ve uzuvlarında anormal duruşlar gelişir.

LBWC nasıl tespit edilir?

Ultrason sırasında göbek kordonunun kısa olması veya hiç olmaması, bebeğin tarama boyunca sabit ve garip bir pozisyonda olması veya yüz veya karın bölgesinde herhangi bir anormallik görülmesi durumunda LBWC'den şüphelenilir.

LBWC'ye ne sebep olur?

LBWC'nin nedeni bilinmemektedir ancak erken gebelik gelişimindeki sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Embriyo düzgün bir şekilde katlanmaz ve bükülmezse veya hayati organlara giden kan akışında bir kesinti olursa, bu durum ciddi fetal anormalliklerle

Ekstremit  V cut Duvar Kompleksi (LBWC)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

sonu lanan bir dizi adımı bařlatabilir.  o u zaman bebe in y z  veya karında olması gereken organları plasentaya ba lanır.

Daha fazla tetkik yaptırmalı mıyım?

LBWC tanısı, anne karnından bir ultrason cihazı kullanılarak 11-13 hafta gibi erken bir d nemde konulabilir. Bazı durumlarda doktor, ek g r nt ler elde etmek i in vajinaya k   k bir ultrason probu yerleřtirilmesini  nerebilir. Ek testler genellikle gerekli de ildir.

Hamilelik sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Ne yazık ki, LBWC'den etkilenen bir ok bebek do umdan  nce  lmektedir. Bu bebeklerin sahip oldu u sorunların ciddiyeti nedeniyle, ebeveynler isterlerse ve bu se enek yasal olarak mevcutsa hamileli i sonlandırma se ene ine sahiptir. Ebeveynler hamileli e devam etmeyi se erse, fetal b y meyi de erlendirmek ve plasentayı de erlendirmek i in daha fazla ultrason muayenesi yapılması gerekir. LBWC, rahim duvarına sıkıca yapıřan veya rahim a zına yakın ve al akta duran bir plasentaya sahip olmakla iliřkilendirilmiřtir; bu da anneyi hamilelik sırasında veya do um sırasında kanama riski altında bırakabilir.

Do duktan sonra bebe imi ne bekliyor?

Do uma kadar hayatta kalan LBWC'li bebekler canlı do abilir veya do um s recinde  lebilir. Genellikle bebek plasenta ile birlikte do ar ve bebek do umda olduk a řekilsiz g r nebilir. Canlı do an bebekler kısa bir s re hayatta kalabilir. Do umdan sonra bebe e yardımcı olacak doktor ekibi, bebe i daha rahat ettirmek i in bazı  nlemler  nerebilir. Bu  nlemleri do umdan sonra bebe e yardımcı olacak ekiple  nceden g r řmek isteyebilirsiniz. Ancak bu  abalara ra men bebeklerin  o u do umdan kısa bir s re sonra  lecektir.

Tekrar olur mu?

LBWC'nin bařka bir hamilelikte tekrar meydana gelmesi  ok d ř k bir ihtimaldir.

Yasal Uyarı:

Bu broř r n i eri i sadece genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıřtır. Temel almanız gereken tıbbi tavsiye niteli inde de ildir. Bu broř rde yer alan i eri e dayanarak herhangi bir eylemde bulunmadan veya herhangi bir eylemden ka ınmadan  nce bireysel durumunuzla ilgili olarak profesyonel veya uzmanlařmıř bireysel tıbbi tavsiye almalısınız. Broř rlerimizdeki bilgileri g ncellemek i in makul  abayı g stermemize ra men, broř r m zdeki i eri in do ru, eksiksiz veya g ncel oldu una dair a ık veya dolaylı hi bir beyan, garanti veya taahh tte bulunmamaktayız.