

รกมีสองกลีบ (Succenturiate หรือ Bilobed Placenta)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

รกมีสองกลีบคืออะไร?

โดยปกติ รกจะมีรูปร่างเป็นแผ่นกลมแผ่นเดียว รกมีสองกลีบเป็นรกที่มีรูปร่างแตกต่างออกไปที่บางครั้งพบได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ รกในลักษณะนี้จะมียกเล็กเพิ่มออกมา โดยหากกลีบที่เพิ่มออกมามีขนาดเล็กกว่ากลีบหลักจะเรียกว่า รกน้อย (succenturiate lobe) แต่หากรกทั้งสองกลีบมีขนาดใกล้เคียงกันจะเรียกว่า รกแยกเป็นสองกลีบ (bilobed placenta)

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทำไมรกมีสองกลีบ อาจเกิดจากพัฒนาการของการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงรก มีบางรายงานบ่งชี้ว่าพบได้บ่อยขึ้นในการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้ว (in vitro fertilization หรือ IVF) แม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

ควรเฝ้าระวังอะไรระหว่างการตั้งครรภ์?

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจว่ามีหลอดเลือดที่วิ่งเชื่อมระหว่างกลีบของรกรวมทั้งผ่านใกล้ปากมดลูกหรือไม่ ภาวะนี้เรียกว่า หลอดเลือดเกาะต่ำ (vasa previa) ซึ่งเป็นภาวะอันตราย เพราะหากถุงน้ำคร่ำแตก หลอดเลือดเหล่านี้อาจฉีกขาดและทำให้ทารกเสียเลือดมากได้ ดังนั้นเมื่อพบว่ามียกสองกลีบ จำเป็นต้องตรวจหาภาวะหลอดเลือดเกาะต่ำด้วยอัลตราซาวด์ขณะตั้งครรภ์

มีผลต่อการคลอดอย่างไร?

หลังคลอด จำเป็นต้องตรวจให้แน่ใจว่ารกทั้งสองกลีบคลอดออกมาครบถ้วน แพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์จะตรวจรกหลังคลอดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนรกเหลือค้างอยู่ในโพรงมดลูก

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?

ยังไม่มีหลักฐานว่ามีโอกาสเกิดซ้ำมากกว่าคนทั่วไป

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: กันยายน 2023