

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูก (Interstitial Ectopic Pregnancy)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูกคืออะไร?

โดยปกติ การตั้งครรภ์ที่มีตัวอ่อนจะฝังตัวในโพรงมดลูก แต่ในการตั้งครรภ์นอกมดลูก (ectopic pregnancy) ตัวอ่อนจะไปฝังตัวและเจริญเติบโตนอกโพรงมดลูก การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูกคือการตั้งครรภ์ที่ตัวอ่อนไปฝังตัวในท่อนำไข่ (fallopian tube) ส่วนต้นที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูก (interstitial หรือ intramural portion)

เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่เกิดในท่อนำไข่ชนิดหนึ่ง ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก เคยผ่าตัดท่อนำไข่ ตั้งครรภ์ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว (in vitro fertilization หรือ IVF) ได้รับการกระตุ้นไข่ (ovulation induction) หรือเคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

จะมีอาการอะไรบ้าง?

อาการอาจคล้ายการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดอื่น ได้แก่

- ขาดประจำเดือน (amenorrhea) เป็นอาการที่พบได้บ่อย อย่างไรก็ตาม ในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นประจำเดือน
- เลือดออกทางช่องคลอด อาจออกกะปริดกะปรอย ออกนาน หรือออกเป็นพัก ๆ
- ปวดท้องน้อย มักปวดข้างใดข้างหนึ่ง อาจมีอาการเจ็บเวลาคลำ หรืออาจปวดรุนแรง
- บางรายมีอาการระบบทางเดินอาหาร (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน) ทำให้คาดเดาว่าเป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ (gastroenteritis) มากกว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูก

วินิจฉัยได้อย่างไร?

การตรวจวินิจฉัยหลักคือ การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (transvaginal ultrasound หรือ TVS) ซึ่งช่วยให้แพทย์เห็นตำแหน่งของการตั้งครรภ์ได้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้ในระยะแรกทำได้ยาก เพราะอาจสับสนกับการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกที่อยู่ค่อนข้างไปด้านข้าง (eccentric intrauterine pregnancy) หรือการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แคบสุด (isthmic tubal ectopic pregnancy)

แพทย์อาจตรวจเลือดระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (beta-hCG) เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ และตรวจติดตามระดับฮอร์โมนเป็นระยะ ระดับฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นไม่ดัดแปลงในเวลา 2-3 วัน อาจบ่งชี้ว่าเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก แต่ไม่สามารถยืนยันว่าเป็นการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูกโดยเฉพาะเจาะจงได้ บางรายอาจต้องตรวจเลือดซ้ำทุก 2-3 วัน อีกหลายครั้งจนกว่าผลการตรวจอัลตราซาวด์จะยืนยันการวินิจฉัยได้แน่นอน

ควรเฝ้าระวังอะไรระหว่างการตั้งครรภ์?

การตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูก (Interstitial Ectopic Pregnancy)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย – สิ่งที่คุณควรรู้และควรถาม

หากไม่ได้รับการรักษา การตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเติบโตจนทำให้ท่อนำไข่แตก และเกิดเลือดออกในช่องท้องอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากถุงการตั้งครรภ์ฝังตัวในท่อนำไข่ส่วนที่แทรกอยู่ในมดลูกซึ่งมีกล้ามเนื้อมดลูก (myometrium) ล้อมรอบอยู่ และมีหลอดเลือดบริเวณนี้จำนวนมาก การแตกของการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้จึงทำให้เลือดออกในช่องท้องรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะช็อกจากการเสียเลือด (hypovolemic shock) หรือมารดาเสียชีวิต ดังนั้น หากมีอาการปวดท้องมาก หรือมีอาการที่น่ากังวลอื่น ๆ ต้องไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดทันที

มีทางเลือกในการรักษาอะไรบ้าง?

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต การตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้จำเป็นต้องยุติลงทันทีหลังได้รับการวินิจฉัย วิธีการรักษาขึ้นกับอาการ ความต้องการมีบุตรในอนาคต ระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ และการมีชีวิตของตัวอ่อน

การผ่าตัดเป็นทางเลือกแรกในการรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้ เพื่อป้องกันการแตกของท่อนำไข่ สำหรับการให้ยา เช่น ยาเมโทเทรกเซต (methotrexate) อาจเลือกใช้ได้หากระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ต่ำกว่า 5,000 ยูนิต อย่างไรก็ตาม การสลายของการตั้งครรภ์โดยสมบูรณ์จะใช้เวลามากกว่าการผ่าตัด (ใช้เวลาประมาณ 20 สัปดาห์ หากฉีดยาเมโทเทรกเซต เข้ากล้ามเนื้อ และ 16 สัปดาห์ หากฉีดเข้าถุงการตั้งครรภ์)

จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?

ความเสี่ยงในการเกิดซ้ำต่ำมาก แต่ผู้หญิงที่เคยผ่าตัดรักษาการตั้งครรภ์นอกมดลูกชนิดนี้อาจมีความเสี่ยงมดลูกแตกในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เนื่องจากการผ่าตัดมุมบนของมดลูกออก (cornual resection) อาจทำให้ผนังมดลูกอ่อนแอ ดังนั้นควรตรวจอัลตราซาวด์ตั้งแต่ระยะแรก และติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์

คำถามอื่น ๆ ที่ควรถาม?

- นัดตรวจติดตามครั้งต่อไปเมื่อไหร่?
- โอกาสที่จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรที่แข็งแรงมีมากน้อยเพียงใด?
- ควรรอนานแค่ไหนก่อนพยายามตั้งครรภ์อีกครั้ง?
- หากตั้งครรภ์อีกครั้ง ต้องปฏิบัติตัวหรือระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ข้อสงวนสิทธิ์:

เนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ที่คุณควรยึดถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการหรือตัดสินใจใด ๆ ตามเนื้อหาใน [แผ่นพับนี้/เว็บไซต์ของเรา] แม้ว่าเราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] เราไม่ได้ให้การรับรอง การประกัน หรือการค้ำประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหาใน [แผ่นพับ/เว็บไซต์ของเรา] มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลล่าสุด

ปรับปรุงล่าสุด: มิถุนายน 2022