

Fetal Kolelitiyazis (Fetal Safra Taşı)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Fetal Kolelitiyazis (Safra Taşı) Nedir?

Safra kesesi, vücudun sindirim için kullandığı safra adı verilen bir sıvıyı tutan karaciğerin yakınındaki küçük bir kesedir. Bazen safra kesesinin içindeki sıvı tam olarak çözülmez ve içinde taş veya çamur olabilir. Bu daha çok yetişkinlerde veya çocuklarda görülür, ancak nadiren doğmadan önceki son üç aylık dönemdeki bir fetüste de olabilir. Bu durum ultrasonda tespit edildiğinde fetal safra taşı olarak da bilinen fetal kolelitiyazis olarak adlandırılır.

Hamileyken fetal kolelitiyazis nasıl teşhis edilir ve izlenir?

Fetal safra taşları genellikle doğumdan önceki birkaç ay içinde rutin bir ultrason sırasında teşhis edilir. Özellikle fetal safra taşı araştırmak için üçüncü trimester ultrasonu yaptırmanıza gerek yoktur. Ancak başka bir tıbbi nedenle üçüncü trimester ultrasonu yaptırıyorsanız, bu teşhis edilebilir. Fetal safra kesesi taşları her 100 hastadan yaklaşık 1'inde bulunur. Teşhis konulduktan sonra, fetal safra taşlarını daha fazla araştırmak veya izlemek için başka bir tetkik gerekmez.

Fetal kolelitiyazise (safra taşı) ne sebep olur?

Fetal safra taşı veya kolelitiyazisin nedeni bilinmemektedir. Fetüsün cinsiyetiyle veya diğer fetal anormalliklerle veya tanılarla bağlantılı değildir. Olguların %75'inden fazlasında teşhis edilen tek anormalliktir ve fetüs ve anneye ilgili diğer her şey normal bulunur. Geri kalan vakalarda, anne ve/veya fetüste, fetal safra taşı oluşma riskini artıracak önceden var olan sağlık sorunları olabilir. Ancak, önceden var olan sağlık sorunları olan hastalarda fetal safra taşları o kadar nadir görülür ki, bu diğer sağlık sorunlarının safra taşı oluşumunda ne kadar etkili olduğunu tam olarak belirlemek zordur. İlişkili olabilecek bu sağlık sorunlarından bazıları plasenta dekolmanı, annenin narkotik kullanımı, uzun süreli açlık, herhangi bir tür diyabet, annede safra taşı öyküsü, Rh veya ABO kan grubu uyumsuzluğu, fetal anatomide anormallikler, genetik anormallikler, düşük amniyotik sıvı veya büyüme kısıtlamasıdır.

Fetal kolelitiyazis nasıl tedavi edilir?

Fetal safra taşları, çocuk bir yaşına gelmeden önce herhangi bir tedavi olmaksızın kendiliğinden düzelme eğilimindedir. Doğumdan sonra çocuk, safra taşlarının düzelip düzelmediğini belirlemek için birkaç hafta ila ayda bir bir ultrason ile izlenebilir ve bu, çocuğun çocuk doktoru ile görüşülerek yapılır. Çoğu çocukta hiçbir zaman belirti görülmez. Fetal kolelitiyazis yalnızca çocuk doğduktan sonra belirtiler gösterirse tedavi edilir. Özellikle yaşamın

Fetal Kolelitiyazis (Fetal Safra Taşı)

Hasta Bilgilendirme Serisi – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

ilk 1-3 haftasında kusma veya hafif ikterik sklera (göz kürelerinin hafif sararması) gibi belirtileri çocuk doktorunuza bildirmelisiniz. Çocuk değerlendirilir ve safra taşlarının çocuğun semptomlarının nedeni olduğu düşünülürse, safra taşları çözülene kadar çocuk ursodeoksikolik asit adı verilen bir ilaçla tedavi edilebilir. Çok nadiren, çocukta semptomlar olabilir ve değerlendirme safra kesesi taşlarının sindirim sularının akışını engellediğini ve kolesistit olarak da bilinen safra kesesi iltihabına neden olduğunu gösterir. Bu son derece nadir durumda, safra kesesinin alınması için ameliyat önerilebilir. Bu ameliyat safra taşlarını ve kolesistiti tedavi edecektir.

Başka hangi soruları sormalıyım?

- Başka kusurlar tespit edildi mi?
- Ne sıklıkla ultrason muayenesi yaptıracağım?
- Bebek doğduktan sonra en iyi bakımı nerede göreceğim?
- Bulduğum bölgede doğumdan sonra ameliyat mümkün mü?
- Bebeğim doğduğunda onunla ilgilenecek doktor ekibiyle önceden tanışabilir miyim?

Güncelleme Eylül 2019