

Serviks (Rahim Ağzı) Tüberkulozu

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Serviks Tüberkulozu Nedir?

Tüberküloz veya TB, vücudunuzun herhangi bir yerini etkileyebilen bir bakteridir, ancak çoğunlukla akciğerleri etkiler. Akciğerlerdeki birincil enfeksiyona akciğer tüberkülozu denir. Bazı durumlarda, TB enfeksiyonu kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine geçer. Bakteri genital bölgeye ulaştığında genital tüberküloz veya pelvik TB'ye neden olur.

Serviks Tüberkulozu Nasıl Oluşur?

Akciğer TB'si olan kadınlar tedavi edilmezse sonunda uterin ve pelvik TB gelişebilir. Rahim ağzının genital tüberkülozu, enfekte bir kişiyle cinsel temas nedeniyle de yayılabilir.

Serviks Tüberkulozu ve Genital Tüberkulozun Genel Belirtileri Nelerdir?

Genital tüberküloz genellikle belirgin belirtileri olmayan sessiz bir enfeksiyondur çünkü bakteriler vücudunuzda 10 ila 20 yıl kadar latent kalabilir. Ancak, dikkat edilmesi gereken belirtilerden bazıları şunlardır:

1. Düzensiz adet döngüsü
2. Pelvik ağrı
3. Kanla lekelenmiş veya kalıcı, yoğun ve renksiz vajinal akıntı
4. Cinsel ilişkiden sonra kanama
5. Kısırlık

Bazen semptomların olmaması genital tüberkülozu teşhis etmeyi zorlaştırır. Semptomlarınıza bağlı olarak doktorunuz tanıyı doğrulamak için testler yaptırmanızı önerebilir.

Genital Tüberküloz Doğurganlığımı Nasıl Etkiler?

Kadınlarda, genital veya pelvik TB genellikle fallop tüplerini etkileyerek tüp tıkanıklığına neden olur ve bu durum tersine çevrilemez. TB erken bir aşamada teşhis edilirse ve enfeksiyon tedavi edilirse, rahim veya fallop tüplerindeki hasar iyileşebilir.

Uzun süre tedavi edilmezse fallop tüplerinde, yumurtalıklarda ve rahimde TB iyileşmeyebilir ve iz bırakabilir. Rahimdeki problem genellikle az adet görmeye sonuçlanır. Bazılarında, rahim

Serviks (Rahim Ağzı) Tüberkulozu

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

duvarı kötü etkilenebileceğinden adet dönemleri tamamen durabilir. Ne yazık ki, bu durumlarda kadınlar gebe kalamayabilir.

Serviks Tüberkulozu ve/veya Genital Tüberkuloz Nasıl Tedavi Edilir?

Genital tüberküloz tedavisi akciğer tüberkülozu veya diğer tüberküloz formlarıyla aynıdır. Yaklaşık altı ila sekiz ay süren bir antibiyotik tedavisidir. Tedavinin tüm sürecini tamamlamak önemlidir.

Son Güncelleme Ağustos 2022