

سکوئستراسیون برونکوپولمونری داخل شکمی مجموعه اطلاعات برای بیماران – آنچه باید بدانید، آنچه باید بپرسید

سکوئستراسیون برونکوپولمونری داخل شکمی چیست؟

سکوئستراسیون برونکوپولمونری توده‌ای غیرطبیعی از بافت ریه است که عملکرد طبیعی ندارد و به راه‌های هوایی متصل نیست. این توده می‌تواند در قفسه سینه یا شکم جنین دیده شود. زمانی که در شکم جنین قرار داشته باشد، به آن «سکوئستراسیون برونکوپولمونری داخل شکمی» گفته می‌شود. این توده عملکرد طبیعی ریه را ندارد و خون‌رسانی اصلی آن از شریان آئورت انجام می‌شود، نه از شریان‌های ریوی.

سکوئستراسیون برونکوپولمونری داخل شکمی چگونه تشخیص داده می‌شود؟

این ضایعه معمولاً در سونوگرافی روتین بین هفته‌های ۱۸ تا ۲۲ بارداری تشخیص داده می‌شود. در این بررسی، ساختارهای مختلف بدن جنین ارزیابی می‌شوند.

در سونوگرافی، این ضایعه به صورت یک توده سفید و جامد در شکم دیده می‌شود.

علت دقیق ایجاد آن مشخص نیست، اما تصور می‌شود در اوایل بارداری یک جوانه اضافی از بافت ریه ایجاد شده و همراه با لوله گوارش به داخل شکم مهاجرت می‌کند.

این بیماری نادر است و در حدود ۱ مورد از هر ۱۰,۰۰۰ تولد دیده می‌شود.

آیا لازم است آزمایش‌های بیشتری انجام دهم؟

تمام جنین‌هایی که توده شکمی دارند باید سونوگرافی دقیق برای بررسی سایر ناهنجاری‌های ساختمانی انجام دهند.

معمولاً سونوگرافی‌های پیگیری برای بررسی رشد توده و وضعیت جنین توصیه می‌شود.

گاهی پزشک ممکن است ام‌آر‌آی جنین را پیشنهاد کند تا تصویر دقیق‌تری از توده به دست آید، به‌ویژه اگر تشخیص قطعی نباشد.

اگر ناهنجاری‌های دیگری نیز وجود داشته باشد، پزشک ممکن است آمنیوسنتز را برای بررسی کروموزوم‌های جنین توصیه کند.

همچنین ممکن است مشاوره با متخصص نوزادان و جراح کودکان پیشنهاد شود تا درباره مراقبت‌های پس از تولد اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

در دوران بارداری باید مراقب چه مواردی بود؟

اغلب این توده تا حدود هفته ۲۶ تا ۲۸ بارداری رشد می‌کند و سپس اندازه آن ثابت می‌ماند یا کوچکتر می‌شود.

سکونستر اسیون برونکوپولمونری داخل شکمی مجموعه اطلاعات برای بیماران – آنچه باید بدانید، آنچه باید بپرسید

گاهی ممکن است توده بزرگتر شود.

در موارد بسیار نادر، جنین ممکن است دچار تجمع مایع در زیر پوست یا اطراف قلب، ریه یا شکم شود.

پزشک سونوگرافی‌های پیگیری را برای بررسی موارد زیر انجام می‌دهد:

- رشد جنین

- اندازه توده

- وجود مایع اضافی داخل یا اطراف بدن جنین

بعد از تولد چه اتفاقی برای نوزاد می‌افتد؟

پس از تولد، معمولاً بررسی‌های بیشتری برای ارزیابی توده انجام می‌شود. نوع بررسی‌ها ممکن است بسته به محل زندگی متفاوت باشد.

درمان این ضایعه به اندازه توده بستگی دارد.

در بیشتر موارد، نوزاد نیاز به جراحی برای برداشتن توده خواهد داشت، اما معمولاً این جراحی اورژانسی نیست.

گاهی اگر توده بسیار کوچک باشد، فقط پیگیری و تحت نظر گرفتن انجام می‌شود.

خبر خوب این است که بیشتر نوزادان مبتلا به این بیماری پیش‌آگهی بسیار خوبی دارند.

آیا ممکن است در بارداری بعدی دوباره تکرار شود؟

احتمال تکرار این مشکل در بارداری بعدی بسیار کم است.

چه سؤالاتی باید از پزشک بپرسم؟

- آیا ناهنجاری دیگری در سونوگرافی دیده می‌شود؟
- چقدر مطمئن هستید که این ضایعه سکونستر اسیون برونکوپولمونری داخل شکمی است؟
- آیا آزمایش دیگری لازم است؟
- هر چند وقت یکبار باید سونوگرافی انجام دهم؟
- آیا نوزاد بعد از تولد نیاز به جراحی خواهد داشت؟
- بهترین محل برای زایمان کجاست؟
- نوزاد بعد از تولد در کجا بهترین مراقبت را دریافت خواهد کرد؟
- آیا می‌توانم قبل از زایمان با تیم پزشکان نوزاد ملاقات کنم؟

سلب مسئولیت

محتوای این بروشور/وبسایت صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و نباید به‌عنوان جایگزین توصیه پزشکی تخصصی در نظر گرفته شود. پیش از انجام یا خودداری از هر اقدامی بر اساس این اطلاعات، لازم است مشاوره پزشکی حرفه‌ای متناسب با شرایط فردی خود دریافت کنید. اگرچه تلاش شده اطلاعات به‌روز باشد، هیچ‌گونه تضمینی در مورد دقت، کامل بودن یا به‌روز بودن محتوا ارائه نمی‌شود.

مترجم و ویراستار:

دکتر سولماز پیری: پریناتولوژیست، سفیر ایزوگ در خاورمیانه و شمال آفریقا و عضو کمیته‌های بیسیک ترینینگ و ویزوگ

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۲