

الكيس المشيمي Placental Cyst

ماهو الكيس المشيمي ؟

هو عبارة عن منطقة صغيرة موجودة في المشيمة يحتوي على مادة سائلة, تكون عادة دون وجود اي دم متدفق لها او بداخلها. في السونار, يظهر كمنطقة داكنة في المشيمة. وقد يكون محاط بحدود بيضاء مشرقة. المناطق الشائعة هي التي تكون مقياسها لا يقل عن 1 سم ولا تشكل اي خطر.

لماذا يحدث الكيس المشيمي؟

يتكون الكيس المشيمي عادة نتيجة لانحلال مادة تسمى الفيبرين في المشيمة. قد يحدث هذا داخل المشيمة، حيث يحدث في جزء من المشيمة ينتمي إلى الأم يُسمى الحاجز الأمي المشيمي ("كيس الحاجز الأمي"), أو على سطح المشيمة ("كيس تحت المشيمي او تحت الصفيحة الجنينية

ما هي الأشياء التي يجب مراقبتها خلال الحمل؟

الكيس الذي يقل حجمه عن 5 سم والذي لا يحتوي على تدفق دم إليه أو داخله لا يسبب مشاكل في الحمل. الكيس الكبير الذي يزيد عن 5 سم قد يكون مرتبطاً بمشاكل تدفق الدم في المشيمة. لهذا السبب، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل طفل يكون حجمه صغيراً، أو ارتفاع ضغط الدم في الحمل. كلا الحالتين قد تؤدي إلى الحاجة إلى ولادة الطفل في وقت مبكر قبل موعد الولادة المتوقع. إذا كان الكيس كبيراً، فقد يطلب منك طبيبك إجراء المزيد من السونارات خلال الحمل لمراقبة وزن الطفل، ومراقبة ارتفاع ضغط الدم.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لطفلي بعد الولادة؟

إذا كان الكيس صغيراً، فمن المحتمل أن لا يكون له أي تأثير على طفلك. إذا كان هناك كيس مشيمي كبير، أو العديد من الأكياس، فقد يتم إرسال المشيمة للتحليل بعد ولادة الطفل. إذا كان الطفل المولد في وقت مبكر بسبب حجمه صغير أو ارتفاع ضغط الدم، فقد يحتاج طفلك إلى مراقبة أو رعاية إضافية.

هل سيحدث مرة أخرى؟

غير معروف كم مرة يتم العثور على كيس مشيمي مرة أخرى في الحمل التالي. إذا وُلِدَ طفلك صغيراً أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد يتم إرسال المشيمة للتحليل، وقد يكون هذا مفيداً في تحديد مخاطر حدوث هذه الأحداث مرة أخرى.