

Paraovaryan Kistler

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

Paraovaryan Kist Nedir?

Para-ovaryan kist, yumurtalıklar ve fallop tüplerine bitişik olarak bulunan, sıvı dolu bir kesedir. Bu kistlere para-tubal kist veya Morgagni hidatid kisti de denilebilir.

Paraovaryan Kistlerin Nedenleri Nelerdir?

Para-ovaryan kistler genellikle anne karnındaki erken gelişim döneminde normal olarak kaybolan yapıların kalıntılarından kaynaklanır. Müllerian kanal, bu erken yapılardan biridir ve rahim, rahim ağzı, fallop tüpleri ve vajinayı oluşturur.

Bu Kistler Hangi Semptomlara Neden Olur?

Bu kistler genellikle herhangi bir semptoma neden olmaz ve genellikle pelvik ultrason sırasında ya da başka nedenlerle yapılan pelvik cerrahi sırasında tesadüfen keşfedilir. Ancak büyük para-ovaryan kistlerin semptomları şunlar olabilir:

- Baskı hissi
- Zaman zaman ortaya çıkan karın ağrısı
- Karında ağırlık veya doluluk hissi
- Kabızlık
- Sık idrara çıkma

Bu Kistler Nasıl Teşhis Edilir?

Teşhis genellikle pelvik ultrason ile konur. Bununla birlikte, başka nedenlerle yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) de saptanabilir. Doğru teşhis için kistin yumurtalıktan ayrı olarak görülmesi gerekir; aksi takdirde, özellikle yumurtalığa çok yakın bir konumdaysa, bir yumurtalık kisti ile karıştırılabilir. Ayrıca, başka nedenlerle yapılan laparoskopi (kapalı ameliyat) veya laparotomi (açık ameliyat) sırasında da tesadüfen keşfedilebilir. Para-ovaryan kistler genellikle kanserleşme eğiliminde değildir ve kendi kendine çözülme eğilimi gösterebilir veya stabil kalabilir. Boyutları 0,5 cm ile 20 cm arasında değişebilir.

Paraovaryan Kistlerin Beklenen Komplikasyonları Nelerdir?

Paraovaryan Kistler

Hasta Bilgilendirme Serileri – Bilmeniz ve Sormanız Gerekenler.

- **Torsiyon:** Kistin sapı etrafında dönmesi anlamına gelir. Bu durum şiddetli, dayanılmaz ağrıya, bulantı ve kusmaya neden olabilir.
- **Baskı semptomları:** Dev kistler nadir olmakla birlikte, bu kistler rahim, böbrek, mesane ve bağırsak gibi iç organlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durum hidronefroz (idrar birikimine bağlı böbrek şişmesi) gibi sorunlara yol açabilir. Büyük kistler ayrıca rahim kanamasına ve ağrılı cinsel ilişkiye neden olabilir.
- **Kanama:** Kist yırtılırsa iç kanamaya neden olabilir.

Paraovaryan Kistler Nasıl Tedavi Edilir?

- **Küçük ve asemptomatik kistler:** Ultrason ile takip yeterlidir.
- **Büyük para-ovaryen kistler:** Katı veya hiperekojenik içerikler gibi şüpheli özellikler gösteren kistler, boyutlarına bağlı olarak laparoskopi veya laparotomi ile çıkarılmalıdır.
- **Torsiyon:** Para-ovaryen kistlerin dönmesi durumunda, kistin çıkarılması için acil laparoskopi veya acil laparotomi uygulanır.

Son Güncelleme Ağustos 2023